

LAMIDERM Crème

Indications

- En cas de brûlures du premier et du second degré, de coups de soleil et toute autre plaie non infectée
- En cas de rougeurs de la peau suite à des traitements radiothérapeutiques

Mode d'emploi

- Brûlures du premier degré et coups de soleil
Appliquer Lamiderm en couche épaisse et laisser pénétrer sans masser.
Renouveler 2 à 4 fois par jour.
- Brûlures du second degré et toute autre plaie non infectée
Après nettoyage de la plaie, appliquer Lamiderm en couche épaisse et renouveler les applications plusieurs fois par jour.
Recouvrir si besoin d'une compresse humidifiée.
- Rougeurs de la peau suite à des traitements radiothérapeutiques
En général, 2 à 3 applications quotidiennes de Lamiderm en faisant pénétrer par un léger massage.

Ne pas utiliser en cas de

- Allergie connue à l'un des composants
- Plaie avec saignement
- Plaie infectée

Composition

Eau purifiée, paraffine liquide légère, monostéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, propylène glycol, paraffine solide, perhydrosqualène, huile d'avocat, alginate de trolamine et de sodium, trolamine, palmitate de cétyle, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, parfum honélia

Durée de conservation

Conservée à une température ambiante (15-25°C), ce produit peut être conservé jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.

Emballage et délivrance

Tube de 60 ml.

Délivrance libre en pharmacie.

Date de la dernière mise à jour de ce notice: 20/08/2010

Fabricant et distributeur

Qualiphar N.V./S.A.

Rijksweg 9

B-2880 Bornem